

Urologische Praxis Lohne-Vechta

Franziskusstraße 4 49393 Lohne

Tel.: 04442-7027300 mail: info@urologie-lohne.de

Einverständniserklärung

Bevor wir eine Beschneidung (Circumcision) durchführen, muss die folgende Einverständniserklärung unterzeichnet werden:

Sehr geehrter Herr..... , Sie haben sich entschlossen, eine Beschneidung bei sich durchführen zu lassen. Die Kosten des Eingriffes werden, wenn sie medizinisch begründet ist, von der Krankenkasse übernommen. In den anderen Fällen beraten wir Sie über die im Rahmen der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) entstehenden Kosten.

In Lokalanästhesie werden das äußere und innere Vorhautblatt im Bereich der Eichel entfernt. Die Penisschafthaut wird danach am Übergang von der Eichel zum Penis festgenäht. Das bedeutet, dass die Eichel danach freiliegt. Die Naht hinter dem Eichelkranz ist kaum zu sehen.

Komplikationen und Nebenwirkungen: Schwellungen bilden sich im Allgemeinen nach einigen Tagen zurück, können aber in seltenen Fällen auch länger bestehen. Bei Wundheilungsstörungen oder entsprechender genetischer Veranlagung können schmerzende und ästhetisch störende Narbenwucherungen mit Hautverfärbungen (Keloide) entstehen. Diese sind jedoch äußerst selten. Die Empfindlichkeit der Eichel kann sich nach dem Eingriff vorübergehend aber auch auf Dauer erhöhen oder vermindern. Wundinfektionen sind selten. Sie können auftreten, wenn bereits vor der Operation eine Entzündung bestand. Verletzungen von Penis und Harnröhre mit Fistelbildung sind sehr selten.

Obwohl es sich um einen Eingriff in Lokalanästhesie handelt, sollten Sie mit Begleitperson kommen, die Sie nach Hause fährt. Sie können vorher essen und trinken. Nach der Operation können noch leichte Schmerzen im Wundbereich auftreten. Am Operationstag verbleibt der Verband um den Penis. Sie können dabei normal Wasserlassen. Am Tag nach der Operation können Sie duschen. Baden sollten Sie etwa 14 Tage vermeiden. Das Nahtmaterial löst sich in der Regel innerhalb von ca. 2 Wochen auf.

In dieser Zeit kann die Nahtstelle schmierig belegt sein und auch bisweilen unschön aussehen. Das ist kein Grund zur Besorgnis. Ungefähr 3-4 Wochen nach dem Eingriff ist dann auch Geschlechtsverkehr wieder möglich.

Bitte fragen Sie nach allem, was Ihnen wichtig erscheint oder unklar ist. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit dem Eingriff einverstanden sind, über die Folgen und Risiken aufgeklärt wurden Sie alle interessierenden Fragen stellen konnten.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift